

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Pertussin® Sirup

Wirkstoff: Thymiankraut-Fluidextrakt (8,0 g in 100 g Sirup).

Zur Anwendung bei Kindern ab 1 Jahr, Jugendlichen und Erwachsenen.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Pertussin® Sirup und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Pertussin® Sirup beachten?
3. Wie ist Pertussin® Sirup einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Pertussin® Sirup aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Pertussin® Sirup und wofür wird er angewendet?

Pertussin® Sirup ist ein pflanzliches Arzneimittel bei katarrhalischen Erkrankungen der Atemwege.

Pertussin® Sirup wird angewendet bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim und zur Besserung der Beschwerden bei akuter Bronchitis.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Pertussin® Sirup beachten?

Pertussin® Sirup darf nicht eingenommen werden,

wenn Sie allergisch gegen Thymian oder andere Lamiaceen (Lippenblütler), Birke, Beifuß, Sellerie, Sucrose oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Pertussin® Sirup einnehmen.

Bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf, muss ein Arzt aufgesucht werden.

Einnahme von Pertussin® Sirup zusammen mit anderen Arzneimitteln

Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Pertussin® Sirup soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Dieses Arzneimittel enthält 4 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme (30 ml) bis zu 0,95 g Alkohol zugeführt.

Pertussin® Sirup kann daher die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigen.

Pertussin® Sirup enthält Ethanol (Alkohol) und Sucrose (Zucker).

Dieses Arzneimittel enthält 4 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme bei Kindern von 1 - < 4 Jahren pro 10 ml bis zu 0,32 g Alkohol, bei Kindern von 4 - 12 Jahren pro 15 ml bis zu 0,48 g Alkohol und bei Heranwachsenden ab 12 Jahren und Erwachsenen pro 30 ml bis zu 0,95 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren, Stillenden und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose. Bitte nehmen Sie Pertussin® Sirup erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Zwei zur Marke 15 ml gefüllte Messbecher (=30 ml) enthalten insgesamt 23,68 g Sucrose (Zucker) entsprechend ca. 2 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

3. Wie ist Pertussin® Sirup einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dosierung

Falls vom Arzt nicht anders verordnet ist die empfohlene Dosis:

Alter bzw. Körpergewicht	Einzeldosis	Tagesgesamtdosis
Kinder ab 1- < 4 Jahre	10 ml*	3 mal täglich 10 ml*

(ca. 8 – 16 kg)	(entsprechend 1,03 g Thymiankraut- Fluidextrakt)	(entsprechend 3,10 g Thymiankraut-Fluidextrakt)
Kinder ab 4-12 Jahre (ca. 16 – 43 kg)	15 ml* (entsprechend 1,55 g Thymiankraut-Fluidextrakt)	4 mal täglich 15 ml* (entsprechend 6,19 g Thymiankraut-Fluidextrakt)
Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene	30 ml* (entsprechend 3,10 g Thymiankraut-Fluidextrakt)	3-4 mal täglich 30 ml* (entsprechend 9,29-12,39 g Thymiankraut-Fluidextrakt)

* Ein entsprechend markierter Messbecher liegt bei.

Art der Anwendung

Nehmen Sie Pertussin® Sirup mit etwas Flüssigkeit (z.B. ½ Glas Wasser) ein.

Beachten Sie die Graduierung des Messbechers!

Schütteln Sie die Flasche Pertussin® Sirup vor dem Gebrauch!

Dauer der Anwendung

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem Verlauf der Erkrankung und ist vom Arzt zu bestimmen. Beachten Sie bitte in jedem Fall die Angaben im Abschnitt 2. unter „Was sollten Sie vor der Einnahme von Pertussin® Sirup beachten?“ sowie die Angaben im Abschnitt 4. unter „Welche Nebenwirkungen sind möglich?“.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Pertussin® Sirup zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Pertussin® Sirup eingenommen haben, als Sie sollten:

Vergiftungen mit Pertussin® Sirup sind bisher nicht bekannt geworden. Bei Einnahme zu großer Mengen von Pertussin® Sirup können möglicherweise die unter "Nebenwirkungen" beschriebenen Beschwerden verstärkt auftreten. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Einnahme von Pertussin® Sirup vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Wenn Sie die Einnahme von Pertussin® Sirup abbrechen:

Falls Sie das Arzneimittel absetzen, weil es bei Ihnen nicht wie erwünscht wirkt, fragen Sie bitte Ihren Arzt, ob andere Arzneimittel in Frage kommen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen
Häufig:	kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen
Gelegentlich:	kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen
Selten:	kann bis zu 1 von 1000 Behandelten betreffen
Sehr selten:	Kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z. B. Luftnot, Hautausschläge, Nesselsucht sowie Schwellungen in Gesicht, Mund und/oder Rachenraum, auftreten.

Sehr selten kann es auch zu Magenbeschwerden, wie Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen, kommen.

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Präparat abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden. Dieser kann über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Pertussin[®] Sirup nicht nochmals eingenommen werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte,

Abt. Pharmakovigilanz,

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3,

D-53175 Bonn,

Webseite: www.bfarm.de

anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Pertussin[®] Sirup aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Flaschenetikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Die Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 3 Wochen.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Pertussin[®] Sirup enthält

- Der Wirkstoff ist: Fluidextrakt aus Thymiankraut.
100 g (entspr. 77,5 ml) Sirup enthalten: 8,0 g Fluidextrakt aus Thymiankraut (1: 2-2,5),
Auszugsmittel: Ammoniaklösung 10% (m/m), Glycerol 85%, Ethanol 90% (V/V),
Wasser (1:20:70:109).
- Die sonstigen Bestandteile sind: Citronensäure-Monohydrat, Sucrose, Gereinigtes Wasser.

Wie Pertussin® Sirup aussieht und Inhalt der Packung

Pertussin® Sirup ist ein klarer oder schwach getrübler, hellbrauner bis bräunlichgelber Sirup in einer Braunglasflasche mit einem Ausgießer (Gießring), weißem Schraubverschluss und aufgesetzter Dosierhilfe (Messbecher).

Pertussin® Sirup ist in Packungen zu 240 g Sirup erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

medphano Arzneimittel GmbH
Maienbergstraße 10 - 12
15562 Rüdersdorf bei Berlin
Tel.: (033638) 7 49-0
Fax: (033638) 7 49-77
E-Mail: info@medphano.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2018.

Zusätzliche Informationen über Eigenschaften des Arzneimittels:

Pertussin® Sirup enthält einen alkoholhaltigen Extrakt aus Thymiankraut. Zubereitungen aus Thymian werden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege angewandt, können zu einer Verflüssigung von zähem Bronchialsekret und zu einer Entkrampfung der Bronchialmuskulatur beitragen und das Abhusten erleichtern. Aufgrund des Gehaltes an ätherischem Öl (Thymol) besitzt Pertussin® Sirup den typischen Thymianduft.

Pertussin® Sirup erhalten Sie exklusiv in Ihrer Apotheke.

475A0007